



MAAILMA DOPINGUVASTANE KOODEKS
RAHVUSVAHELINE STANDARD
KEELATUD AINETE JA
KEELATUD MEETODITE
NIMEKIRI

2025

SISUKORD

NB! Alltoodud meditsiiniliste seisundite näidete loetelu ei ole täielik.

AINED JA MEETODID, MIS ON ALATI KEELATUD

S0	Heaksiitmata ained	4
S1	Anaboolse toimega ained	5
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt meeste hüpogonadismi ravis.	
S2	Peptiidhormoonid, kasvufaktorid, samasuguse toimega ained ja mimeetikumid	7
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt aneemia, meeste hüpogonadismi ja kasvuhormooni vaeguse ravis.	
S3	Beeta-2 agonistid	9
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt astma ja teiste hingamisteede haiguste ravis.	
S4	Hormoonid ja metaboolsed modulaatorid	10
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt rinnavähi, diabeedi, viljatuse (naistel) ja polütsütiliste munasarjade ravis.	
S5	Diureetikumid ja maskeerivad ained	12
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt südamepuudulikkuse ja hüpertensiooni ravis.	
M1 – M2 – M3	Keelatud meetodid	13

VÕISTLUSSISESELT KEELATUD AINED JA MEETODID

S6	Stimuleeriva toimega ained	14
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt anafülsia, aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), külmetushaiguste ja gripi sümpтомite ravis.	
S7	Narkootilise toimega ained	16
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt valu, sealhulgas skeletilihaste vigastustest põhjustatud valu ravis.	
S8	Kannabinoidid	17
S9	Glükokortikoidid	18
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt allergia, anafülsia, astma ja põletikulise soolehaiguse ravis.	

AINULT TEATUD SPORDIALADEL KEELATUD AINED

P1	Beetablokaatorid	19
	Mõni aine võib / mõned ained võivad piiranguteta sisalduva ravimite, mida kasutatakse nt südamepuudulikkuse ja hüpertensiooni ravis.	
	INDEKS	20

2025. AASTA KEELATUDAINETE JA KEELATUD MEETODITE NIMEKIRI

MAAILMA DOPINGUVASTANE KOODEKS

KEHTIB 1. JAANUARIST 2025

Sissejuhatus

Keelatud ainete ja keelatud metodite nimekiri on maailma dopinguvastasesse programmi kuuluv kohustuslik rahvusvaheline standard.

Nimekirja uuendatakse igal aastal pärast WADA algatatud põhjalikke konsultatsioone. See nimekiri jõustub 1. jaanuaril 2025.

WADA kinnitab *keelatud ainete ja keelatud metodite nimekirja* ametliku teksti ning avaldab selle inglise ja prantsuse keeles. Vasturääkivuste esinemisel inglisi- ja prantsuskeelse versiooni vahel on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Allpool on esitatud mõni selles *keelatud ainete ja keelatud metodite nimekirjas* kasutatud mõiste.

Võistlussiseselt keelatud

Kui WADA ei ole konkreetse spordiala puhul muud ajavahemikku määranud, loetakse *võistlussiseseks* ajavahemikuks ajavahemikku, mis algab *võistluse*, kus *sportlane* osaleb, eelsel päeval vahetult enne keskööd (kell 23.59) ning kestab kuni *võistluse* ja *dopinguproovide* kogumise lõpuni.

Alati keelatud

See tähendab, et aine või meetod on *koodeksis* sätestatu kohaselt keelatud *võistlussiseselt* ja *võistlusväliselt*.

Määratletud ja määratlemata

Maailma dopinguvastase koodeksi artiklis 4.2.2 on sätestatud, et „artikli 10 kohaldamisel loetakse kõiki *keelatud aineid määratletud aineteks*, kui *keelatud ainete ja keelatud metodite nimekirjas* ei ole määratud teisiti. Keelatud meetod on *määratletud meetod üksnes juhul*, kui see on *keelatud ainete ja keelatud metodite nimekirjas* sõnaselgelt nimetatud *määratletud metodiks*. Koodeksisse on selle artikli juurde lisatud ka kommentaar, milles täpsustatakse, et „artiklis 4.2.2 sätestatud *määratletud aineid ja määratletud meetodeid* ei tohi mingil moel pidada vähem oluliseks või ohutumaks kui teisi dopingaineid või dopingumeetodeid. Pigem on tegemist ainete ja meetoditega, mida *sportlane* on suurema tõenäosusega manustanud või kasutanud muul eesmärgil kui sportliku sooritusvõime parandamine“.

Narkootilised ja psühhotroopsed ained

Koodeksi artikli 4.2.3 järgi on *narkootilised ja psühhotroopsed ained* sellised ained, mis on sellistena nimetatud, kuna neid kasutatakse ühiskonnas sageli spordiväliselt. *Narkootistik ja psühhotroopseteks aineteks* loetakse järgmisi aineid: kokaiin, diamorfiin (heroiin), metüleendioksümetamfetiin (MDMA/„ecstasy“), tetrahüdrokannabinool (THC).

Avalda:

Maailma Dopinguvastane Agentuur
Place Victoria, 800, rue du
Square-Victoria, bureau 1700
Montréal (Québec)
H3C OB4 Kanada

URL www.wada-ama.org
Tel +1 514 904 9232
Faks +1 514 904 8650
E-post code@wada-ama.org

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*.

Ükskõik milline farmakoloogiline aine, mida ei ole käsitletud mõnes *nimekirja* järgmistest punktidest ja mille kasutamiseks inimeste ravimise eesmärgil ei ole kehtivat luba väljastanud ükski riiklik reguleeriv terviseasutus (nt eelkliinilises või kliinilises arenduses olevad ravimid, tootmisest kõrvaldatud ravimid, nn designer drugs, veterinaarravimid), on alati keelatud.

See klass hõlmab mitut erinevat ainet (loetelu ei ole lõplik): BPC-157, 2,4-dinitrofenool (DNP), rüanodiini retseptori ja kalstabiin 1 kompleksi stabilisaatorid [nt S-107, S48168 (ARM210)] ning troponiini aktivaatorid (nt reldesemtiiv ja tirasemtiiv).

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratlemata ained*.

Anaboolse toimega ained on keelatud.

S1.1. ANDROGEENSE TOIMEGA ANABOOLSED STEROIDID (AAS)

Eksogeense manustamise korral, loetelu ei ole lõplik:

- 1-androsteendiool (5α -androst-1-een- $3\beta,17\beta$ -diool);
- 1-androsteendioon (5α -androst-1-een-3,17-dioon);
- 1-androsteroon (3α -hüdroksü- 5α -androst-1-een-17-oon);
- 1-epiandrosteroon (3β -hüdroksü- 5α -androst-1-een-17-oon);
- 1-testosteroon (17β -hüdroksü- 5α -androst-1-een-3-oon);
- 4-androsteendiool (androst-4-een- $3\beta,17\beta$ -diool);
- 4-hüdroksütestosteroon ($4,17\beta$ -dihüdroksüandrost-4-een-3-oon);
- 5-androsteendioon (androst-5-een-3,17dioon);
- 7α -hüdroksü-DHEA;
- 7β -hüdroksü-DHEA;
- 7-keto-DHEA;
- 11β -metüül-19-nortestosteroon;
- 17α -metüülepiostanool (epistaan);
- 19-norandrosteendiool (östr-4-een-3,17diool);
- 19-norandrosteendioon (östr-4-een-3,17dioon);
- androst-4-een-3,11,17-trioon
(11-ketoandrosteendiool, adrenosteroon);
- androstanoloon (5α -dihüdrotestosteroon, 17β -hüdroksü- 5α -androstaan-3-oon);
- androsteendiool (androst-5-een- $3\beta,17\beta$ -diool);
- androsteendioon (androst-4-een- $3,17$ -dioon);
- bolasteroon;
- boldenoon;
- boldioon (androsta-1,4-dieen-3,17-dioon);
- kalusteroon;
- klostebool;
- danasool ([1,2]oksasolo[4',5':2,3]pregna-4-een-20-üün- 17α -ool);
- dehüdroklorometüüttestosteroon (4-kloro- 17β -hüdroksü- 17α -metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);
- desoksümetüüttestosteroon (17α -metüül- 5α -androst-2-een- 17β -ool ja 17α -metüül- 5α -androstaan-17-oon- 17β -ool);
- dimetandroloon ($7\alpha,11\beta$ -dimetüül-19-nortestosteroon);
- drostanoloon;
- epiandrosteroon (3β -hüdroksü- 5α -androstaan-17-oon);
- epi-dihüdrotestosteroon (17β -hüdroksü- 5β -androstaan-3-oon);
- epitestosteroon;
- etüülostrenoole (19-norpregna-4-een- 17α -ool);
- fluoksümesteroon;
- formeboloon;
- furasabool (17α -metüül[1,2,5]oksadiasolo[3',4':2,3]- 5α -androstaan-17-oon);

S1.1. ANDROGEENSE TOIMEGA ANABOOLSED STEROIDID (AAS) (jätkub)

- gestrinoon;
- mestanoloon;
- mesteroloon;
- metaandienoon (17β -hüdroksü- 17α -metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon);
- metenoloon;
- metaandriool;
- metasteroon (17β -hüdroksü- 2α , 17α -dimetüül- 5α -androstaan-3-oon);
- metüül-1-testosteroon (17β -hüdroksü- 17α -metüül- 5α -androst-1-een-3-oon);
- metüulklostebool;
- metüüldienoloon (17β -hüdroksü- 17α -metüülöstra-4,9-dieen-3-oon);
- metüülnortestosteroon (17β -hüdroksü- 17α -metüülöstr-4-een-3-oon);
- metüültestosteroon;
- metriboloon (metüültrienoloon, 17β -hüdroksü- 17α -metüülöstra-4,9,11-trieen-3-oon);
- miboleroon;
- nandroloon (19-nortestosteroon);
- norboletoon;
- norklostebool (4-kloro- 17β -ool-östr-4-een-3-oon);
- noretandrooloon;
- oksaboloon;
- oksandrooloon;
- oksüümesteroon oksümetoloon;
- prasteroon (dehüdroepiandrosteroon, DHEA, 3β -hüdroksüandrost-5-een-17-oon);
- prostanosool (17β -[(tetrahüdropüraan-2-üül) oksü]-1'H-pürasolo[3,4:2,3]- 5α -androstaan);
- kvinboloon;
- stanosolool;
- stenboloon;
- testosteroon;
- tetrahüdrogestrinoon (17 -hüdroksü- 18α -homo- 19 -nor- 17α -pregna-4,9,11-trieen-3-oon);
- tiboloon;
- trenboloon (17β -hüdroksüöstr-4,9,11-trieen-3-oon);
- trestoloon (7α -metüül- 19 -nortestosteroon, MENT)

ja teised sarnase keemilise struktuuri või sarnas(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

S1.2. MUUD ANABOOLSE TOIMEGA AINED

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

klenbuterool, osilodrostaat, raktopamiin, selektiivsed androgeeni retseptori modulaatorid [SARM-id, nt andariin, enobosarm (ostariin), LGD-4033 (ligandrool), RAD140, S-23 ja YK-11], zeranool ja zilpateerool.

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratlemata ained*.

Keelatud on järgmised ained ja teised sarnase keemilise struktuuri või sarnas(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

S2.1. ERÜTROPOETIINID (EPO) JA ERÜTROPOEESI MÖJUTAVAD AINED

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- S2.1.1** erütropoetiini retseptori agonistid, nt darbepoetiinid (dEPO); erütropoetiinid (EPO); EPO-põhised konstruktid [nt EPO-Fc, metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin (CERA)]; EPO-mimeetilised ained ja nende konstruktid (nt CNTO-530, peginesatiid);
- S2.1.2** hüpoksiast indutseeritud faktorit (HIF) aktiveerivad ained, nt koobalt; daprodustaat (GSK1278863); IOX2; molidustaat (BAY 85-3934); roksadustaat (FG-4592); vadamustaat (AKB-6548); ksenoon;
- S2.1.3** GATA inhibiitorid, nt K-11706;
- S2.1.4** transformeeriva kasvufaktori-beeta (TGF- β) signaaliraja inhibiitorid, nt luspatertsept; sotatersept;
- S2.1.5** sünnipärase paranemise retseptori agonistid, nt asialo EPO; karbamüülitud EPO (CEPO).

S2.2. PEPTIIDHORMOONID JA NEID VABASTAVAD FAKTORID

- S2.2.1** Testosterooni stimuleerivad peptiidid meestel, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):
- koorioni gonadotropiin (CG);
 - luteiniseeriv hormoon (LH);
 - gonadotropiini vabastav hormoon (GnRH, gonadoreliin) ja selle agonisti analoogid (nt busereliin, desloreliin, gosereliin, histreliin, leuproreliin, nafareliin ja triptoreliin);
 - kisspeetiin ja selle agonisti analoogid.
- S2.2.2** Kortikotrofiinid ja neid vabastavad faktorid, nt kortikoreliin ja tetrakosaktiid
- S2.2.3** Kasvuhormoon (GH), selle analoogid ja fragmendid, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):
- kasvuhormooni analoogid, nt lonapegsomatropiin, somapatsitaan ja somatrogoon;
 - kasvuhormooni fragmendid, nt AOD-9604 ja hGH 176-191.
- S2.2.4** Kasvuhormooni vabastavad faktorid, sealhulgas (loetelu ei ole lõplik):
- kasvuhormooni vabastav hormoon (GHRH) ja selle analoogid, nt CJC-1293, CJC-1295, sermoreliin ja tesamoreliin;
 - kasvuhormooni sekretsiooni suurendavad ained (GHS-id) ja nende mimeetikumid [nt anamoreliin, kapromoreliin, ibutamoren (MK-677), ipamoreliin, lenomoreliin (greliin), matsimoreliin ja tabimoreliin];
 - GH-d vabastavad peptiidid (GHRP-d) [nt aleksamoreliin, eksamoreliin (heksareliin), GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreliin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 ja GHRP-6].

S2.3. KASVUFAKTORID JA KASVUFAKTORI MODULAATORID

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- fibroblastide kasvufaktorid (FGF-id);
- hepatotsüüdi kasvufaktor (HGF);
- insuliinilaadne kasvufaktor 1 (IGF-1, mekasermiin) ja selle analoogid;
- mehaanilised kasvufaktorid (MGF-id);
- trombotsüütidest pärinev kasvufaktor (PDGF);
- tümosiin- β 4 ja selle derivaadid, nt TB-500;
- vaskulaarse endoteeli kasvufaktor (VEGF)

ja teised kasvufaktorid või kasvufaktori modulaatorid, mis mõjutavad lihase, kõõluse või sideme valkude sünteesi/lagunemist, vaskularisatsiooni, energia kasutamist, taastumisvõimet või kiutüübi teisenemist.

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*.

Keelatud on kõik selektiivsed ja mitte selektiivsed beeta-2 agonistid, sealhulgas kõik optilised isomeerid.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- arformoterool;
- fenoterool;
- formoterool;
- higenamiin;
- indakaterool;
- levosalbutamool;
- olodaterool;
- prokaterool;
- reproterool;
- salbutamool;
- salmeterool;
- terbutaliin;
- tretokinool (trimetokinool);
- tulobuterool;
- vilanterool.

(i) ERANDID

- Inhaleeritav salbutamool: maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul jagatuna annusteks, kuid mitte üle 600 mikrogrammi 8 tunni jooksul alates ükskõik millisest annusest;
- Inhaleeritav formoterool: maksimaalne annus 54 mikrogrammi 24 tunni jooksul jagatuna annusteks, kuid mitte üle 36 mikrogrammi 12 tunni jooksul alates ükskõik millisest annusest;
- Inhaleeritav salmeterool: maksimaalselt 200 mikrogrammi 24 tunni jooksul;
- Inhaleeritav vilanterool: maksimaalselt 25 mikrogrammi 24 tunni jooksul.

⚠ MÄRKUS

Salbutamooli kontsentratsiooni uriinis üle 1000 ng/ml või formoterooli kontsentratsiooni uriinis üle 40 ng/ml ei loeta aine ettenähtud raviotstarbeliseks kasutuseks ja seda käsitletakse *halva analüütilise leiuna (AAF)*, välja arvatud juhul, kui *sportlane* tööndab kontrollitud farmakokineetilise uuringuga, et normist kõrvalekalduv tulemus oli tingitud raviotstarbelise annuse kasutamisest (inhaleerimisest) ülaltoodud maksimumväärustele piires.

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Klasside S4.1 ja S4.2 keelatud ained on *määratletud ained*.

Klasside S4.3 ja S4.4 ained on *määratlemata ained*.

Keelatud on järgmised hormoonid ja metaboolsed modulaatorid.

S4.1. AROMATAASI INHIBIITORID

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- 2-androstenool (5α -androst-2-een-17-ool);
- 2-androstenoon (5α -androst-2-een-17-oon);
- 3-androstenool (5α -androst-3-een-17-ool);
- 3-androstenoon (5α -androst-3-een-17-oon);
- 4-androsteen-3,6,17-trioon (6-okso);
- aminoglutetimiid;
- anastrosool;
- androsta-1,4,6-trieen-3,17-dioon (androstatrieendioon);
- androsta-3,5-dieen-7,17-dioon (arimistaan);
- eksemestaan;
- formestaan;
- letrosool;
- testolaktoon.

S4.2. ANTIÖSTROGEENSE TOIMEGA AINED [ANTIÖSTROGEENID JA SELEKTHIVSED ÖSTROGEENI RETSEPTORI MODULAATORID (SERM-ID)]

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- basedoksifeen;
- klomifeen;
- tsükklofeniil;
- elatsestrant;
- fulvestrant;
- ospemifeen;
- raloksifeen;
- tamoksifeen;
- toremifeen.

S4.3. AINED, MIS HOIAVAD ÄRA AKTIVIINI RETSEPTORI IIB AKTIVEERIMISE

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- aktiviin A neutraliseerivad antikehad;
- aktiviini retseptori IIB konkureandid, nagu:
 - aktiviini decoy-retseptorid (nt ACE-031);
- anti-aktiviini retseptori IIB antikehad (nt bimagrumb);
- müostatiini inhibiitorid, nagu:
 - müostatiini ekspressiooni vähendavad või kõrvaldavad ained;
 - müostatiiniga seonduvad valgud (nt follistatiin, müostatiini propeptiid);
 - müostatiini või prekursorit neutraliseerivad antikehad (nt apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

S4.4. METABOOLSED MODULAATORID

S4.4.1

- AMP aktiveeritud proteiini kinaasi (AMPK) aktivaatorid, nt AICAR, 12S rRNA-c mitokondriaalne avatud serv (MOTS-c);
- peroksisoomi proliferaatori aktiveeritud retseptor delta (PPAR δ) agonistid, nt 2-[2-metüül-4-((4-metüül-2-[4-(trifluorometüül)fenüül]tiasool-5-üül)metüültio)fenoksü] äädikhape (GW1516, GW501516);
- REV-ERB α agonistid, nt SR9009, SR9011.

S4.4.2 Insuliinid ja insuliini mimeetikumid, nt S519, S597

S4.4.3 Meldoonium

S4.4.4 Trimetasidiin

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*.

Keelatud on kõik diureetikumid ja maskeerivad ained, sealhulgas kõik optilised isomeerid, nt asjakohastel juhtudel *D*- ja *L*-isomeerid.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- diureetikumid, nagu:
atsetasoolamiid, amiloriid, bumetaniid, kanrenoon, kloortalidoon, etakrüünhape, furosemiid, indapamiid, metolasoon, spironolaktoon, tiasiidid, nt bendoflumetasiid, klorotiasiid ja hüdroklorotiasiid; torasemiid, triamtereen; ksipamiid;
 - vaptaanid, nt konivaptaan, mosavaptaan, tolvaptaan;
 - veenisisesel manustamisel vereplasma mahu suurendajad, nagu:
alumiin, dekstraan, hüdroksüetüütärklis, mannitool;
 - desmopressiin;
 - probenetsiid
- ja teised sarnase keemilise struktuuri või sarnas(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

(i) ERANDID

- Drospirenoon, pamabroom ja silmadesse paikselt manustatavad karboanhüdraasi inhibiitorid (nt dorsolamiid, brinsolamiid)
- Felüpressiini paikne manustamine hambaravi anesteesias

⚠ MÄRKUS

Aine, mille suhtes on kehtestatud piirväärtsused (nt formoterool, salbutamool, katiin, efedriin, metüülefedriin ja pseudoefedriin), mis tahes koguse avastamist *sportlaselt võetud dopinguproovis võistlussiseselt* või *võistlusväliselt* koos diureetikumi või muu maskeeriva ainega (välja arvatud karboanhüdraasi paikne silmadesse manustamine või felüpressiini paikne manustamine hambaravi anesteesias) käsitletakse *halva analüütilise leiuna (AAF)*, välja arvatud juhul, kui *sportlasel* on lisaks diureetikumi või muu maskeeriva aine raviotstarbelise kasutamise eriloale (TUE) ka vastava aine suhtes väljastatud *raviotstarbelise kasutamise eriluba (TUE)*.

KEELATUD MEETODID

ALATI KEELATUD (VÕISTLUSSISESELT JA VÕISTLUSVÄLISELT)

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud meetodid on *määratlemata meetodid*, välja arvatud M2.2 meetodid, mis on *määratletud meetodid*.

M1. VERE JA VERE KOOSTISOSADE MANIPULATSIOONID

Keelatud on järgmine:

- M1.1.** ükskõik millise koguse autoloogse, allogeenese (homoloogse) või heteroloogse vere või ükskõik millise päritoluga erütrotsüütide preparaatide *manustamine* või tagasiviimine vereringesse.

MÄRKUS

Vere või verekomponentide doonorlus, sealhulgas afereesi teel, ei ole keelatud, kui see toimub riiklikult registreeritud ja akrediteeritud verekeskus.

- M1.2.** hapniku sidumist, hapniku transporti või kudede hapnikuga varustamist kunstlikult soodustavate preparaatide kasutamine.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

perfluoroühendid, efaproksiraal (RSR13), vokselotoor ja modifitseeritud hemoglobiinipreparaadid, nt hemoglobiinipõhisid vereasendajad ja mikrokapslites hemoglobiinipreparaadid, välja arvatud inhaleeritav lisahapnik;

- M1.3.** vere või vere koostisosade mis tahes liiki intravaskulaarne manipulatsioon füüsikaliste või keemiliste vahenditega.

M2. KEEMILINE JA FÜÜSIKALINE MANIPULEERIMINE

Keelatud on järgmine:

- M2.1.** *võltsimine* või *võltsimiskatse* eesmärgiga muuta *dopingukontrolli* ajal kogutud *dopinguproovide* terviklust ja kehtivust.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

dopinguproovi asendamine ja/või muutmine, nt proteaaside lisamine *dopinguproovile*;

- M2.2.** intravenoosset infusioonid ja/või süstid mahus üle 100 ml 12-tunnise ajavahemiku jooksul, välja arvatud õiguspärastel juhtudel haiglaravi, kirurgiliste protseduuride või kliiniliste diagnostiliste uuringutega seoses.

M3. GEENI- JA RAKUDOPING

Järgmine on keelatud seoses sportliku sooritusvõime võimaliku tõhustamisega:

- M3.1.** nukleiinhapete või nukleiinhappe analoogide kasutamine, mis võivad muuta genoomi järjestust ja/või geeniekspresiooni mis tahes mehhaniزم. Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik) geeni muutmise, geeni vaigistamise ja geeniuulekande tehnoloogiad;

- M3.2.** normaalsete või geneetiliselt muundatud rakkude kasutamine.

KEELATUD VÕISTLUSSISESELT

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*, välja arvatud need, mis kuuluvad klassi S6.A ja mis on *määratlemata ained*.

Narkootilised ja psühhotroopsed ained selles punktis: kokaiin ja metüleendioksümetamfetamiin (MDMA/„ecstasy“).

Keelatud on kõik stimuleeriva toimega ained, sealhulgas kõik optilised isomeerid, nt asjakohastel juhtudel D- ja L-isomeerid.

Stimuleeriva toimega ained on järgmised.

S6.A: MÄÄRATLEMATA STIMULEERIVA TOIMEGA AINED:

- adrafiniil;
- amfepramoon;
- amfetamiin;
- amfetamiiniil;
- amifenasool;
- benfluoreks;
- bensüülpiperasiin;
- bromantaan;
- klobensoreks;
- kokaiin;
- kropropamiid;
- krotetamiid;
- fenkamiin;
- fenetüliin;
- fenfluramiin;
- fenproporeks;
- fonturatsetaam [4-fenüülpiratsetaam (karfedoon)];
- furfenoreks;
- hüdrafiniil (fluorenool);
- lisdeksamfetamiin;
- mefenoreks;
- mefentermiin;
- mesokarb;
- metamfetamiin (*D*-);
- p-metüülamfetamiin;
- modafiniil;
- norfenfluramiin;
- fendimetrasiiin;
- fentermiin;
- prenüülamiamiin;
- prolintaan.

Selles punktis sõnaselgelt nimetamata stimuleeriva toimega aine on *määratletud aine*.

S6.B: MÄÄRATLETUD STIMULEERIVA TOIMEGA AINED

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- 2-fenüülpropaan-1-amiin (β -metüüfenüütüülamiiin, BMPEA);
- 3-metüülheksaan-2-amiin (1,2-dimetüülpentüülamiiin);
- 4-fluorometüülfenidaat;
- 4-metüülheksaan-2-amiin (1,3-dimetüülamüülamiiin, 1,3-DMAA, metüülheksaanamiin);
- 4-metüülpentaan-2-amiin (1,3-dimetüülbütüülamiiin);
- 5-metüülheksaan-2-amiin (1,4-dimetüülamüülamiiin, 1,4-dimetüülpentüülamiiin, 1,4-DMAA);
- bensfetamiin;
- katiin**;
- katinoon ja selle analoogid, nt mefedroon, metedroon ja α -pürrolidinovalerofenoon;
- dimetamfetamiin (dimetüülamfetamiin);
- efedriin***;
- epinefriin**** (adrenaliin);
- etamivaan;
- etüülfenidaat;
- etüülamfetamiin;
- etilefriin;
- famprofasoon;
- fenbutrasaat;
- fenkamfamiin;
- heptaminool;
- hüdroksüämfetamiin (parahüdroksüämfetamiin);
- isometeepteen;
- levmetamfetamiin;
- meklofenoksaat;
- metüleendioksüämfetamiin;
- metüülefedriin***;
- metüülnaftidaat [(\pm) -metüül-2-(naftaleen-2-üül)-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat];
- metüülfenidaat;
- midodriin;
- niketamiid;
- norfenefriin;
- oktodriin (1,5-dimetüülheksüülamiiin);
- oktopamiin;
- oksilofriin (metüülsünefriin);
- pemoliin;
- pentetrasool;
- fenetüülamiiin ja selle derivaadid;
- fenmetraasiin;
- fenprometamiin;
- propüülheksedriin;
- pseudoefedriin*****;
- selegiliin;
- sibutramiin;
- solriamfetool;
- strühniin;
- tenamfetamiin (metüleendioksüämfetamiin);
- tesofensiin;
- tuamiinheptaan

ja teised sarnase keemilise struktuuri või sarnas(t)e bioloogilis(t)e toime(te)ga ained.

(i) ERANDID

- Klonidiin, guanfatsiin
- Nahale, ninna, silma või kõrva manustamiseks ette nähtud imidasoliini derivaadid (nt brimonidiin, klonasoliin, fenoksasoliin, indanasoliin, nafasoliin, oksümetasoliin, tetrüsoliin, tramasoliin, ksülometasoliin) ja need stimuleeriva toimega ained, mis on võetud 2025. aasta WADA jälgimisnimekirja*.

* Bupropioon, kofeiin, nikotiin, fenüülefriin, fenüülpopropanoolamiin, pipradrool ja sünefriin: need ained on võetud 2025. aasta jälgimisnimekirja ja need ei ole *keelatud ained*.

** Katiin (D-norpseudoefedriin) ja selle L-isomeer on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 5 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

*** Efedriin ja metüülefedriin on keelatud, kui ükskõik kumma kontsentratsioon uriinis ületab 10 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

**** Epinefriimi (adrenaliini) manustamine paiksest, näiteks nina kaudu, silmaravis või koos lokaalanestetikumidega, ei ole keelatud.

***** Pseudoefedriin on keelatud, kui selle kontsentratsioon uriinis ületab 150 $\mu\text{g}/\text{ml}$.

KEELATUD VÕISTLUSSISESELT

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määaratletud ained*.
Narkootiline ja psühhotroopne aine selles punktis: diamorfiin (heroiin)

Keelatud on järgmised narkootilise toimega ained, sh kõik optilised isomeerid, nt asjakohastel juhtudel D- ja L-isomeerid:

- buprenorfiin;
- fentanüül ja selle derivaadid;
- morfiin;
- pentasotsiin;
- dekstromoramiid;
- hüdromorfoon;
- nikomorfiin;
- petidiin;
- diamorfiin (heroiin);
- metadoon;
- oksükodoon;
- oksümorfoon;
- tramadol.

KEELATUD VÕISTLUSSISESELT

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*.

Narkootiline ja psühhotroopne aine selles punktis: tetrahüdrokannabinool (THC)

Keelatud on kõik looduslikud ja sünteetilised kannabinoidid, nt:

- kanep (hašiš, marihuaana) ja kanepitooted;
- looduslikud ja sünteetilised tetrahüdrokannabinoolid (THC-d);
- sünteetilised THC-laadse toimega kannabinoidid.

(i) ERANDID

- Kannabidiool

KEELATUD VÕISTLUSSISESELT

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*.

Keelatud on kõik glükokortikoidid, mida manustatakse süstimisel, suukaudselt, [sealhulgas oromukosaalselt (nt bukaalselt, gingivaalselt, sublingvaalselt)] või rektaalselt.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- beklometasoon;
- beetametasoon;
- budesoniid;
- tsiklesoniid;
- kortisoon;
- deflasakort;
- deksametasoon;
- flunisoliid;
- fluokortoloon;
- flutikasoon;
- hüdrokortisoon;
- metüülprednisoloon;
- mometasoon;
- prednisoloon;
- prednisoon;
- triamtsinoloonatsetoniid.

⚠ MÄRKUS

- Muud manustamisviisid (sealhulgas inhaleerimine ja toopiline, dentaal-intrakanaalne, dermaalne, intranasaalne, oftalmoloogiline, aurikulaarne ja perianaalne) ei ole keelatud, kui ainet kasutatakse tootja lubatud annustes ja terapeutiliste näidustuste korral.

KEELATUD AINULT TEATUD SPORDIALADEL

Kõik sellesse klassi kuuluvad keelatud ained on *määratletud ained*.

Beetablokaatorite kasutamine on allpool nimetatud spordialadel keelatud ainult *võistlussiseselt*. Neil aladel, mis on tärniga tähistatud, on beetablokaatorite kasutamine keelatud ka *võistlusväliselt*.

- Vibulaskmine (WA)*
- Autosport (FIA)
- Piljard (kõik võistlusadalad) (WCBS)
- Noolevise (WDF)
- Golf (IGF)
- Minigolf (WMF)
- Laskesport (ISSF, IPC)*
- Allveesport (CMAS)* kõikidel vabasukeldumise, allveekalapüügi ja allveelaskmise *target shooting*'i aladel.

*Keelatud ka *võistlusväliselt*.

Nende hulka kuuluvad (loetelu ei ole lõplik):

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| • atsebutolool; | • bunolool; | • labetalool; | • oksprenolool; |
| • alprenolool; | • karteolool; | • metipranolool; | • pindolool; |
| • atenolool; | • karvedilool; | • metoprolool; | • propranolool; |
| • betaksolool; | • tseliprolool; | • nadolool; | • sotalool; |
| • bisoprolool; | • esmolool; | • nebivolool; | • timolool. |

INDEKS

- (±)-metüül-2-(naftaleen-2-üül)-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat], 15

1-androsteendiool, 5

1-androsteendioon, 5

1-androsteroon, 5

1-epiandrosteroon, 5

1-testosteroon, 5

1,2-dimetüülpentüülamüüliin, 15

[1,2]oksasolo[4',5':2,3]pregna-4-een-20-üün-17 α -ool, 5

1,3-dimetüülamüüliin (1,3-DMAA), 15

1,3-dimetüülbüülamüüliin, 15

1,4-dimetüülamüüliin (1,4-DMAA), 15

1,4-dimetüülpentüülamüüliin, 15

1,5-dimetüülheksüülamüüliin, 15

2-androstenool, 10

2-androstenoon, 10

2-fenüülpropaan-1-amiin, 15

2,4-dinitrofenool (DNP), 4

3 α -hüdroksü-5 α -androst-1-een-17-oon, 5

3 β -hüdroksü-5 α -androst-1-een-17-oon, 5

3 β -hüdroksü-5 α -androstaan-17-oon, 5

3 β -hüdroksüandrost-5-een-17-oon, 6

3-androstenool, 10

3-androstenoon, 10

3-metüülheksaan-2-amiin, 15

4-androsteen-3,6,17-trioon, 10

4-androsteendiool, 5

4-fenüülpiratsetaaam, 14

4-fluorometüülfenidaat, 15

4-hüdroksütestosteroon, 5

4-kloro-17 β -hüdroksü-17 α -metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon, 5

4-kloro-17 β -ool-östr-4-een-3-oon, 6

4-metüülheksaan-2-amiin, 15

4-metüülpentaan-2-amiin, 15

4,17 β -dihüdroksüandrost-4-een-3-oon, 5

5-androsteendioon, 5

5-metüülheksaan-2-amiin, 15

5 α -androst-1-een-3,17-dioon, 5

5 α -androst-1-een-3 β ,17 β -diool, 5

5 α -androst-2-een-17-ool, 10

5 α -androst-2-een-17-oon, 10

5 α -androst-3-een-17-ool, 10

5 α -androst-3-een-17-oon, 10

5 α -dihüdrotestosteroon, 5

6-okso, 10

7-keto-DHEA, 5

7 α ,11 β -dimetüül-19-nortestosteroon, 5

7 α -hüdroksü-DHEA, 5

7 α -metüül-19-nortestosteroon, 6

7 β -hüdroksü-DHEA, 5

11-ketoandrosteendioon, 5

11 β -metüül-19-nortestosteroon, 5

12S rRNA-c (MOTS-c)

mitokondriline avatud lugemisraam, 11

17-hüdroksü-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-triene-3-oon, 6

17 α -metüül[1,2,5]oksadiasolo[3',4':2,3]-5 α -androstaan-17 β -ool, 5

17 α -metüül-5 α -androst-2-een-17 β -ool, 5

17 α -metüül-5 α -androst-3-een-17 β -ool, 5

17 α -metüüleptiostanool, 5

17 β -[(tetrahüdropüraan-2-üül)oksü]-1'H-pürasolo[3,4:2,3]-5 α -androstaan, 6

17 β -hüdroksü-17 α -metüül-5 α -androst-1-een-3-oon, 6

17 β -hüdroksü-17 α -metüülandrosta-1,4-dieen-3-oon, 6

17 β -hüdroksü-17 α -metüülöstr-4-een-3-oon, 6

17 β -hüdroksü-17 α -metüülöstra-4,9,11-triene-3-oon, 6

17 β -hüdroksü-17 α -metüülöstra-4,9-dieen-3-oon, 6

17 β -hüdroksü-2 α ,17 α -dimetüül-5 α -androstaan-3-oon, 6

17 β -hüdroksü-5 α -androst-1-een-3-oon, 5

17 β -hüdroksü-5 α -androstaan-3-oon, 5

17 β -büdroksü-5 β -androstaan-3-oon, 5

17 β -büdroksüöstr-4,9,11-triene-3-oon, 6

19-norandrosteendiool, 5

19-norandrosteendioon, 5

19-norpregna-4-een-17 α -ool, 5

19-nortestosteroon, 6

α -pürrolidinovalerofenoon, 15

β -metüülfenüületüülamüüliin, 15

A

ACE-031, 11

Adrafinil, 14

Adrenaliin, 15

Adrenosteroon, 5

Aferees, 13

AICAR, 11

Aktiviin A neutraliseerivad antikehad, 11

Aktiviini retseptori IIB konkureandid, 11

Albumiin, 12

Aleksamoreliin, 8

Alprenolool, 19

Amfepramoon, 14

Amfetamiin, 14

Amfetaminiil, 14

Amifenasool, 14

Amilioid, 12

Aminoglutetimiid, 10

AMP aktiveeritud proteiini kinaas (AMPK), 11

AMP aktiveeritud proteiini kinaasi aktivaatorid (AMPK-d), 11

Anamoreliin, 8

Anastrosool, 10

Andariin, 6

Androst-4-een-3,11,17-trioon, 5

Androst-4-een-3,17-dioon, 5

Androst-4-een-3 β ,17 β -diool, 5

Androst-5-een-3,17-dioon, 5

Androst-5-een-3 β ,17 β -diool, 5

Androsta-1,4,6-triene-3,17-dioon, 10

Androsta-1,4-dieen-3,17-dioon, 5

Androsta-3,5-dieen-7,17-dioon, 10

Androstanoloon, 5

Androstatrieendioon, 10

INDEKS

Androsteendiool, 5
Androsteendioon, 5
Anti-aktiviini retseptori IIB
antikehad, 11
AOD-9604, 8
Apitegromab, 11
Arformoterool, 9
Arimistaan, 10
ARM210, 4
Asialo EPO, 7
Atenolool, 19
Atsebutolool, 19
Atsetasoolamiid, 12

B

Basedoksifeen, 10
Beetametasoon, 18
Beklometasoon, 18
Bendroflumetasiid, 12
Benfluoreks, 14
Bensfetamiin, 15
Bensüülpiperasiin, 14
Betaksolool, 19
Bimagrumb, 11
Bisoprololo, 19
BMPEA, 15
Bolasteroon, 5
Boldenoon, 5
Boldioon, 5
BPC-157, 4
Brimonidiin, 15
Brinsolamiid, 12
Bromantaan, 14
Budesoniid, 18
Bumetaniid, 12
Bunolool, 19
Buprenorfiin, 16
Bupropioon, 15
Busereliin, 8

C

CJC-1293, 8
CJC-1295, 8
CNTO-530, 7

D

Danasool, 5
Daprodustaat, 7

Darbepoetiinid (dEPO), 7
Deflasakort, 18
Dehüdroepiandrosteroon (DHEA), 6
Dehüdroklorometüüttestosteroon, 5
Deksametasoon, 18
Dekstraan, 12
Dekstromoramiid, 16
Desloreliin, 8
Desmopressiin, 12
Desoksümetüüttestosteroon, 5
Diamorfiin, 16
Dimetamfetamiin, 15
Dimetandroloon, 5
Dimetüülamfetamiin, 15
Domagrozumab, 11
Dorsolamiid, 12
Drospirenoon, 12
Drostanoloon, 5

E

Ecstasy, 14
Efaproksiraal (RSR13), 13
Efedriin, 12, 15
Eksamoreliin, 8
Eksemestaan, 10
Elatsestrant, 10
Enobosarm, 6
Epiandrosteroon, 5
Epi-dihüdrotestosteroon, 5
Epinefriin, 15
Epistaan, 5
Epitestosteroon, 5
EPO-Fc, 7
EPO-mimeetilised ained, 7
EPO-põhised konstruktid, 7
Erütropoetiini retseptori
agonistid, 7
Erütropoetiinid (EPO), 7
Esmolool, 19
Etakrüünhape, 12
Etamivaan, 15
Etilefriin, 15
Etüülamfetamiin, 15
Etüülfenidaat, 15
Etüülöstrenool, 5

F

Famprofasoon, 15

Felüpressiin, 12
Fenbutrasaat, 15
Fendimetrasiin, 14
Fenetüliin, 14
Fenetüülamiiin, 15
Fenfluramiin, 14
Fenkamfamiin, 15
Fenkamiin, 14
Fenmetrasiin, 15
Fenoksasoliin, 15
Fenoterool, 9
Fenprometamiin, 15
Fenproporeks, 14
Fentanüül, 16
Fentermiin, 14
Fenüülefriin, 15
Fenüülpipropanoolamiin, 15
Fibroblastide kasvufaktorid (FGF-
id), 8

Flunisoliid, 18
Fluokortoloon, 18
Fluoksüümesteroon, 5
Fluorenool, 14
Flutikasoon, 18
Follistatiin, 11
Fonturatsetaan, 14
Formeboloon, 5
Formestaan, 10
Formoterool, 9, 12
Fulvestrant, 10
Furasabool, 5
Furfenoreks, 14
Furosemiid, 12

G

GATA inhibiitorid, 7
Geeni korrigeerimine, 13
Geeni vaigistamine, 13
Geenidoping, 13
Geeniülekanne, 13
Gestrinoon, 6
GH-d vabastavad peptiidid
(GHRP-d), 8
Gonadoreliin, 8
Gonadotropiini vabastav hormoon
(GnRH), 8
Gosereliin, 8
Greliin, 8

INDEKS

Guanfatsiin, 15
GW1516, 11
GW501516, 11

H

Hašiš, 17
Heksareliin, 8
Hemoglobiin
(hemoglobiinipõhised vereasendajad), 13
Hemoglobiin (mikrokapslites preparaadid), 13
Hemoglobiin (preparaadid), 13
Hepatotsüüdi kasvufaktor (HGF), 8
Heptaminool, 15
Heroiin, 16
hGH 176-191, 8
Higenamiin, 9
Histreliin, 8
Hüdrafiniil, 14
Hüdroklorotiasiid, 12
Hüdrokortison, 18
Hüdroksüämfetamiin, 15
Hüdroksüetüütärklis, 12
Hüdromorfoon, 16
Hüpoksiast indutseeritud faktorit (HIF) aktiveerivad ained, 7

I

Ibutamoren, 8
Imidasoliin, 15
Indakaterool, 9
Indanasoliin, 15
Indapamiid, 12
Infusioonid, 13
Insuliini mimeetikumid, 11
Insuliinid, 11
Insuliinilaadne kasvufaktor 1 (IGF-1), 8
Intravenoosset infusioonid/
süstid, 13
IOX2, 7
Ipamoreliin, 8
Isometeepteen, 15

K

K-11706, 7
Kalusteroon, 5

Kanep, 17
Kannabidiool, 17
Kanrenoon, 12
Kapromoreliin, 8
Karbamüülitud EPO (CEPO), 7
Karfedoon, 14
Karteolool, 19
Karvedilool, 19
Kasvuhormoon (GH), 8
Kasvuhormooni sekretsiooni suurendavad ained (GHS-id), 8
Katiin, 12, 15
Katinoon, 15
Kisspeptiin, 8
Klenbuterool, 6
Klobensoreks, 14
Kломifeen, 10
Klonasoliin, 15
Klonidiin, 15
Kloortalidoon, 12
Klorotiasiid, 12
Klostebool, 5
Kofeiin, 15
Kokaiin, 14
Konivaptaan, 12
Koobalt, 7
Koorioni gonadotropiin (CG), 8
Kortikoreliin, 8
Kortikotrofiinid, 8
Kortison, 18
Kropropamiid, 14
Krotetamiid, 14
Ksenoon, 7
Ksipamiid, 12
Ksüلومetasoliin, 15
Kvinboloon, 6

L

Labetalool, 19
Landogrozumab, 11
Lenomoreliin, 8
Letrosool, 10
Leuproreliin, 8
Levmetamfetamiin, 15
Levosalbutamool, 9
LGD-4033, 6
Ligandrool, 6
Lisdeksamfetamiin, 14

Lonapegsomatropiin, 8
Luspaterzept, 7
Luteiniseeriv hormoon (LH), 8

M

Mannitool, 12
Marihuaana, 17
Matsimoreliin, 8
Mefedroon, 15
Mefenoreks, 14
Mefentermiin, 14
Mehaanilised kasvufaktorid (MGF-id), 8
Mekasermiin, 8
Meklofenoksaat, 15
Meldoonium, 11
MENT, 6
Mesokarb, 14
Mestanoloon, 6
Mesteroloon, 6
Metaandienoon, 6
Metaandriool, 6
Metadoon, 16
Metamfetamiin(D-), 14
Metasteroon, 6
Metedroon, 15
Metenoloon, 6
Metipranolool, 19
Metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin (CERA), 7
Metolasoon, 12
Metoprolool, 19
Metriboloon, 6
Metüleendioksüämfetamiin, 15
Metüleendioksümetamfetamiin, 15
Metüül-1-testosteroon, 6
Metüüldienoloon, 6
Metüülefedriin, 12, 15
Metüülfenidaat, 15
Metüülheksaanamiin, 15
Metüulklostebool, 6
Metüülnaftidaat, 15
Metüülnortestosteroon, 6
Metüülprednisoloon, 18
Metüülsünefriin, 15
Metüültestosteroon, 6
Metüültrienoloon, 6
Miboleroon, 6

INDEKS

- Midodriin, 15
MK-677, 8
Modafiniil, 14
Molidustaat, 7
Mometasoon, 18
Morfiin, 16
Mosavaptaan, 12
MOTS-c, 11
Müostatiini inhibiitorid, 11
Müostatiini neutraliseerivad antikehad, 11
Müostatiini prekursorit neutraliseerivad antikehad, 11
Müostatiini propeptiid, 11
Müostatiiniga seonduvad valgud, 11
- N**
Nadolool, 19
Nafareliin, 8
Nafasoliin, 15
Nandroloon, 6
Nebivolool, 19
Niketamiid, 15
Nikomorfiin, 16
Nikotiin, 15
Norboletoon, 6
Noretandroloon, 6
Norfeneefriin, 15
Norfenfluramiin, 14
Norklostebool, 6
Nukleiihappe analoogid, 13
Nukleinhapped, 13
- O**
Oksaboloon, 6
Oksandroloon, 6
Oksilofriin, 15
Oksprenolool, 19
Oksükodoon, 16
Oksümetesteroon, 6
Oksümetasoliin, 15
Oksümetoloon, 6
Oksümorfoon, 16
Oktodriin, 15
Oktopamiin, 15
Olodaterool, 9
Osilodrostaat, 6
Ospemifeen, 10
- Ostariin, 6
- P**
Pamabroom, 12
Parahüdroksüämfetamiin, 15
Pingesatiid, 7
Pemoliin, 15
Pentasotsiin, 16
Pentetrasool, 15
Perfluoroühendid, 13
Peroksisoomi proliferaatori aktiveeritud
Petidiin, 16
Pindolool, 19
Pipradrool, 15
p-metüülamfetamiin, 14
Pralmoreliin, 8
Prasteroon, 6
Prednisoloon, 18
Prednisoon, 18
Prenüülamtiin, 14
Probenetsiid, 12
Prokaterool, 9
Prolintaan, 14
Propranolool, 19
Propüülheksedriin, 15
Prostanosool, 6
Proteaasid, 13
Pseudofedriin, 12, 15
- R**
RAD140, 6
Rakk (doping), 13
Rakk (erütrotsüüdid), 13
Rakk (geneetiliselt muundatud), 13
Rakk (normaalne), 13
Raktopamiin, 6
Raloksifeen, 10
Reldesemtiiv, 4
Reprotoorol, 9
retseptor delta agonistid, 11
REV-ERB α agonistid, 11
Roksadustaat, 7
Rüanodiini[retseptori ja 1-kalstabiini kompleksi stabilisaatorid, 4
- S**
S-107, 4
S-23, 6
S48168, 4
S519, 11
S597, 11
Salbutamool, 9, 12
Salmeterool, 9
Selegiliin, 15
Selektiivsed androgeeni retseptori modulaatorid (SARM-id), 6
Seranool, 6
Sermoreliin, 8
Sibutramiin, 15
Silpaterool, 6
Solriamfetool, 15
Somapatsitaan, 8
Somatrogoon, 8
Sotalool, 19
Sotatertsept, 7
Spiironolaktoon, 12
SR9009, 11
SR9011, 11
Stamulumab, 11
Stanosolool, 6
Stenboloon, 6
Strühniin, 15
Sünefriin, 15
Sünnipärase paranemise retseptori agonistid, 7
Süstid (> 100 ml), 13
- T**
Tabimoreliin, 8
Tamoksifeen, 10
TB-500, 8
Tenamfetamiin, 15
Terbutaliin, 9
Tesamoreliin, 8
Tesofensiin, 15
Testolaktoon, 10
Testosteroon, 6
Testosterooni stimuleerivad peptiidid, 8
Tetrahüdrogestrinoon, 6
Tetrahüdrokannabinoolid, 17
Tetrakosaktiid, 8
Tetrüsoliin, 15

INDEKS

Tiasiidid, 12
Tibloon, 6
Timolool, 19
Tirasemtiiv, 4
Tolvaptaan, 12
Torasemiid, 12
Toremifeen, 10
Tramadol, 16
Tramasoliin, 15
Transformeeriva kasvufaktoribeta (TGF- β) signaaliraja inhibiitorid, 7
Trenboloon, 6
Trestoloon, 6
Tretokinool, 9
Triamtereen, 12
Triamtsinoloonatsetoniid, 18
Trimetasidiin, 11
Trimetokinool, 9

Triptoreliin, 8
Troponiini aktivaatorid, 4
Tselprolool, 19
Tsiklesoniid, 18
Tsüklofeniil, 10
Tuamiinheptaan, 15
Tulobuterool, 9
Tümosiin- β 4, 8

V
Vadadustaat (AKB-6548), 7
Vaptaanid, 12
Vaskulaarse endoteeli kasvufaktor (VEGF), 8
Verega manipulatsioonid, 13
Vereliistakutest pärinev kasvufaktor (PDGF), 8
Vereplasma mahu suurendajad, 12

Veri (autoloogne), 13
Veri (heteroloogne), 13
Veri (homoloogne), 13
Veri (koostisosad), 13
Veri, 13
Vilanterool, 9
Vokselotoor, 13
Võltsimine, 13

Ö
Östr-4-een-3,17-diool, 5
Östr-4-een-3,17-dioon, 5

Y
YK-11, 6